


Questão 42

A posição latitudinal do continente africano faz com que ocorra uma diversidade de biomas. Os mapas a seguir indicam a localização e a extensão de quatro biomas com características distintas.



(Adaptado de Géraud Magrin, Alain Dubresson e Olivier Ninot, *Atlas de l'Afrique*. Paris: Autrement, 2018.)

A partir do exposto e de seus conhecimentos sobre os fatores abióticos e bióticos dos biomas africanos, assinale a alternativa correta.

- a) O Bioma 1 corresponde às formações florestais que se situam nas áreas de baixa latitude. Apresentam baixa diversidade vegetal, com predomínio de coníferas. Ocorrem em áreas com excesso de chuvas, elevadas temperaturas e solos profundos de boa drenagem.
- b) O Bioma 2 abarca as formações mediterrâneas desenvolvidas em solos férteis, em climas com verão úmido e inverno seco. Sua fitofisionomia é formada por arbustos baixos, intercalados por gramíneas. As espécies são caducifólias por conta do período seco.
- c) O Bioma 3 representa as áreas de desertos, que apresentam espécies xerófilas, associados a dois fatores: a corrente marítima fria que dificulta a evaporação da água do mar, e a zona de alta pressão nas médias latitudes, formada por anticiclones.
- d) O Bioma 4 engloba as formações savânicas localizadas entre as florestas e os desertos. Ocorre em solos hidromórficos desenvolvidos em climas tropicais de sazonalidade bem marcada pela pluviosidade, resultando na formação de fitofisionomias abertas.

ALTERNATIVA C

Nas regiões destacadas pelo mapa no Bioma 3, localizam-se áreas desérticas subsaarianas, onde predominam zonas anticlonais tropicais; e, no sudoeste do continente, o deserto do Kalahari, atingido pela corrente oceânica fria de Benguela. Em ambos os locais, predominam espécies vegetais xerófilas resistentes a longos períodos de estiagem e grande amplitude térmica

Ressalva: Importante destacar que a alternativa D aponta o solo típico da savana como hidromórfico, comum em áreas chuvosas, como o Pantanal e a Floresta Amazônica. Todavia, a savana também apresenta períodos de chuva, sobretudo no verão, que alaga seu solo nesse período.